

执业医师《内科学》辅导：急进性肾衰综合征 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/15/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E5_8C_BB_E5_c22_15794.htm 问题：25岁，女性，突然浮肿尿少、血尿，3周后进入昏迷，尿蛋白（ ），RBC 10~15个/HP，WBC 1~3个/HP，颗粒管型0~3个/HP，BP180/110mmHg，BUN 27mmol/L，急诊入院病人入院后各种其他检查没有回报前的紧急措施应采取 A.止血药物应用 B.静点地塞米松 C.静点甘露酶 D.应用速尿及降压治疗 E.抗炎治疗 请问该病人属于哪类病？ 答案及解析：本题选D。患者女性，25岁，有浮肿、尿少、血尿3周，后进入昏迷。查体血压高，实验室检查有尿检异常，BUN升高。明确存在肾损害，起病迅猛，病情危重。考虑有急进性肾衰综合征（RPRF）。在结果回报前，先应用速尿及降压治疗。 ARF：肾功能在短时间（几个时到几天）内突然下降而出现的临床综合征。病因多为脓毒症、肾毒性药物、休克或其原因导致急性肾小管坏死。 RPRF：肾功能在几周内下降而出现的临床综合征。病因多为免疫损伤或血管炎引起毛细血管外增生性（新月体性）肾小球肾炎。若明确病因为急进性肾小球肾炎后，其治疗方案如下 1、肾上腺皮质激素联合细胞毒药物 2、血浆置换 3、三联疗法：目前不推荐使用。 4、对症治疗 5、肾功能替代治疗 转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com