

综合辅导：抗心律失常药 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/16/2021_2022__E7_BB_BC_E5_90_88_E8_BE_85_E5_c23_16950.htm

1.治疗阵发性室上性心动过速的首选药是A 奎尼丁B 苯妥英钠C 维拉帕米D 普萘洛尔E 利多卡因C
2.治疗地高辛引起的室性期前收缩（室早）的首选药是A 奎尼丁B 苯妥英钠C 利多卡因D 胺碘酮E 普鲁卡因胺B
3.治疗急性心肌梗死引起的室性心动过速的首选药是A 奎尼丁B 普鲁卡因胺C 普萘洛尔D 利多卡因E 维拉帕米D
4.哪种药物对心房颤动无效A 奎尼丁B 地高辛C 普萘洛尔D 胺碘酮E 利多卡因E
5.对地高辛引起的窦性心动过缓和轻度房室传导阻滞最好选用A 阿托品B 异丙肾上腺素C 苯妥英钠D 肾上腺素E 氯化钾A
6.奎尼丁最严重的不良反应是A 金鸡纳反应B 药热，血小板减少C 奎尼丁晕厥D 胃肠道反应E 心室率加快C
7.胺碘酮的作用是A 阻滞Na通道B 促K外流C 阻滞Ca²⁺通道D 延长动作电位时程E 阻滞β受体D
8.利多卡因对哪种心律失常无效A 心室颤动B 室性期前收缩C 室上性心动过速D 强心苷引起的室性心律失常E 心肌梗死所致的室性早搏C
9.关于普萘洛尔，抗心律失常的机制，哪项是错误的A 阻断心肌β受体B 降低窦房结的自律性C 降低普氏纤维的自律性D 治疗量就延长普氏纤维的有效不应期E 延长房室结的有效不应期D
10.关于利多卡因的抗心律失常作用，哪一项是错误的A 是窄谱抗心律失常药B 能缩短普氏纤维的动作电位时程和有效不应期C 对传导速度的作用，受细胞外液K⁺浓度的影响D 对心肌的直接作用是抑Na⁺内流，促K⁺外流E 治疗剂量就能降低窦房结的自律性E

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详

细请访问 www.100test.com