

抗肿瘤药：激素类抗肿瘤药-来曲唑 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/235/2021\\_2022\\_\\_E6\\_8A\\_97\\_E8\\_82\\_BF\\_E7\\_98\\_A4\\_E8\\_c23\\_235517.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/235/2021_2022__E6_8A_97_E8_82_BF_E7_98_A4_E8_c23_235517.htm) 【摘要】来曲唑属于激素类抗肿瘤药栏目，主要讲述了药物名称 来曲唑 药物别名 英文名称 Lelrozol 说明 本品为类白色片。 功用作用 绝经后晚期乳腺癌，多用于抗雌激素治疗失败后的二线治疗。5 mg，口服，每日1次。性别、年龄及肝肾功能与来曲唑无临床相关关系，故老年患者和肝肾功能受损的患者不必调整剂量。本文重点关注药物 治疗 口服 功能 等内容，您可以在本页对来曲唑进行讨论【关键字】激素类抗肿瘤药.药物.治疗.口服.功能.来曲唑【全文】药物名称 来曲唑药物别名 英文名称 Lelrozol说明 本品为类白色片。2.5mg。 功用作用 绝经后晚期乳腺癌，多用于抗雌激素治疗失败后的二线治疗。 用法用量 每次2.5 mg，口服，每日1次。性别、年龄及肝肾功能与来曲唑无临床相关关系，故老年患者和肝肾功能受损的患者不必调整剂量。 注意事项 随机分组试验表明，每天口服来曲唑2.5mg，与药物可能相关的不良反应的发生率为33%，明显低于AG组的46%。来曲唑的不良反应多为轻度或中度，以恶心(2%~9%)、头疼(0%~7%)、骨痛(4%~10%)、潮热(0%~9%)和体重增加(2%~8%)为主要表现，其他少见的还有便秘、腹泻、瘙痒、皮疹、关节痛、胸痛、腹痛、疲倦、失眠、头晕、水肿、高血压、心律不齐、血栓形成、呼吸困难、阴道流血等。 转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)