

酰胺醇类抗生素：琥珀氯霉素 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/243/2021\\_2022\\_\\_E9\\_85\\_B0\\_E8\\_83\\_BA\\_E9\\_86\\_87\\_E7\\_c23\\_243136.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/243/2021_2022__E9_85_B0_E8_83_BA_E9_86_87_E7_c23_243136.htm) 药物名称琥珀氯霉素  
药物别名 英文名称 说明注射剂：0.125g；0.25g；0.5；（按氯霉素计）功用作用为氯霉素酯，用药后在体内分解生成氯霉素起作用 用法用量肌肉静滴，1次0.5～1g，1日1～2g 注意事项（1）主要不良反应有粒细胞及血小板减少、再生障碍性贫血等。皮疹、药物热、血管神经性水肿偶有发生。近年报道，本品尚能引起溶血性贫血、铁粒幼细胞贫血、球后视神经炎、循环呼吸骤停、速发性过敏反应及心肌损害等。溶血性贫血多在用药后数小时至2～3天发生，症状为发热，褐色尿、巩膜及皮肤黄染、脾肿大等。尚可发生剥脱性皮炎，但少见。（2）长期应用可能引起视神经炎、共济失调，以及由于菌群失调而致的维生素缺乏和二重感染等。（3）消化道反应有恶心、呕吐、食欲不振、舌炎、口腔炎等。（4）新生儿和早产儿应用本品可引起循环衰竭（灰婴综合征），应禁用。（5）精神病人用本品可引起严重失眠、幻视、幻觉、猜疑、狂躁、忧郁等精神症状，故禁用。（6）本品肌注常引起较剧烈的疼痛，还可致坐骨神经麻痹而造成下肢瘫痪，故已少用。 转贴于：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)