执业药师药剂学:栓剂历年考题 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/246/2021_2022__E6_89_A7_ E4 B8 9A E8 8D AF E5 c23 246760.htm 1.全身作用的栓剂在 直肠中最佳的用药部位在 A.接近直肠上静脉 B.应距肛门口2锄 处 C.接近直肠下静脉 D.接近直肠上、中、下静脉 E.接近肛门 括约肌 (答案B) 2.不作为栓剂质量检查的项目是 A.熔点范 围测定 B.融变时异检查 C.重量差异检查 D.药物溶出速度与吸 收试验 E.稠度检查 (答案E) 3.关于可可豆脂的错误表述是 (答案C) A.可可豆脂具同质多晶性质 B. 晶型最稳定 C.制 备时熔融温度应高于40 D.为公认的优良栓剂基质 E.不宜与 水合氯醛配伍 4.制备栓剂时,选用润滑剂的原则是(答案C) A.任何基质都可采用水溶性润滑剂 B.水溶性基质采用水溶 性润滑剂 C.油溶性基质采用水溶性润滑剂,水溶性基质采用 油脂性润滑剂 D.无需用润滑剂 E.油脂性基质采用油脂性润滑 剂 5.下列有关置换价的正确表述是 A.药物的重量与基质重量 的比值 B.药物的体积与基质体积的比值 C.药物的重量与同体 积基质重量的比值 D.药物的重量与基质体积的比值 E.药物的 体积与基质重量的比值 (答案C) 6.栓剂中主药的重量与同 体积基质重量的比值称 A.酸价 B.真密度 C.分配系数 D.置换价 E.粒密度 (答案D) X型题 1.下列有关栓剂的叙述中,错误的 是 A.栓剂使用时塞得深,生物利用度好 B.局部用药应选释放 慢的基质 C.置换价是药物重量与同体积的基质重量之比 D.pKa E.药物不受胃肠PH、酶的影响,在直肠吸收较口服干 扰少 (答案ACD) 2.增加直肠栓剂发挥全身作用的条件是 A. 粪便的存在有利于药物吸收 B.插入肛门2cm处有利于药物吸

收 C.油水分配系数大释放药物快有利于吸收 D.油性基质的栓剂中加入HLB值大小11的表面活性剂能促使药物从基质向水性 介质扩散有利于药物吸收 E.一般水溶性大的药物有利于药物吸收(答案BDE)转贴于:100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com