

抗肿瘤药:烷化剂抗肿瘤药氨鲁米特 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/248/2021_2022__E6_8A_97_E8_82_BF_E7_98_A4_E8_c23_248247.htm 药物名称 氨鲁米特
物别名 氨基导眠能，氨格鲁米特，氨苯哌酮，奥美定
ORIMENTEN，AMINOBLASTIN，AG英文名称

Aminoglutethimide说明片剂：每片125mg；250mg。功用作用用于绝经后晚期乳腺癌，有效率约30%；对雌激素受体阳性病人有效率更高，达50%~60%。对骨转移者本品疗效较他莫昔芬为好，对软组织转移的疗效不如他莫昔芬，对肝转移的疗效差。本品对他莫昔芬无效者仍可奏效。对卵巢切除术后恶化者及前列腺癌有效。应用时可合并化学疗法。也可用于柯兴综合征。可代替肾上腺切除术或垂体切除术，术后无效者，本品仍可能有效。垂体分泌的促皮质素（ACTH）能对抗本药抑制肾上腺的作用，故使用本药时应合用氢化可的松以阻滞ACTH的这种作用。用法用量口服每次250mg，1日2次，两周后改为每日3~4次，但每日剂量不要超过1g。可与氢化可的松同时服用。开始每日100mg（早晚各20mg，睡前再服60mg），两周后减量，每日40mg（早晚各10mg，睡前再服20mg）。注意事项（1）副作用有嗜睡、困倦、头晕、皮疹、运动失调等。皮疹常发生在用药后，10~15天，持续约5天，多数可自行消退。有的病人可引起胃肠道反应，如恶心、呕吐、食欲不振和腹泻。偶可出现白细胞或血小板减少和甲状腺机能减退。（2）对妊娠或哺乳期妇女及儿童禁用。（3）不宜与他莫昔芬合用，因疗效不增而副作用增加。（4）用药期间应检查血象和血浆电解质。（5）香豆素类抗

凝药、口服降糖药及地塞米松等药物可加速本品的代谢，合用时应注意观察。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com