

护理名词解释：碘过敏试验 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/255/2021_2022__E6_8A_A4_E7_90_86_E5_90_8D_E8_c67_255104.htm 临床上常用碘化物造影剂作肾脏、胆囊、膀胱、支气管、心血管、脑血管造影。此类药物可发生过敏反应，在造影前1 - 2天须先作过敏试验，阴性者，方可作碘造影检查。

一、试验方法

(一) 口服法 口服5% - 10%碘化钾5ml，每日3次，共3天，观察结果。

(二) 皮内注射法 取碘造影剂0.1ml作皮内注射，观察20分钟后判断试验结果。

(三) 静脉注射法 取碘造影剂1ml (30%泛影葡胺1ml)，于静脉内缓慢注射，观察5 - 10分钟后判断试验结果。在静脉注射造影剂前，必须先行皮内注射法，然后再行静脉注射法，如为阴性，方可进行碘剂造影。

二、试验结果判断

(一) 口服后有口麻、头晕、心慌、恶心、呕吐、荨麻疹等症状为阳性。

(二) 皮内注射 局部有红、肿、硬块，直径超过1cm为阳性。

(三) 静脉注射 过敏反应同青霉素。少数病人过敏试验阴性，但在注射碘造影剂时发生过敏反应，故在造影时仍需要备好急救药品，处理同青霉素。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com