

抗肿瘤药：烷化剂抗肿瘤药-白消安 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/256/2021_2022__E6_8A_97_E8_82_BF_E7_98_A4_E8_c67_256527.htm 【摘要】白消安属于烷化剂抗肿瘤药栏目，主要讲述了药物名称白消安 药物别名白血福恩，马利兰，Busulphan，MYLERAM 英文名称 Busulfan 说明片剂：每片0.5mg；2mg。功用作用 本品口服吸收良好，迅速分布到各组织中去， $t_{1/2}$ 约2~3小时。几乎所有药物经代谢后均以甲烷磺酸形式自尿中缓慢排出。24小时排出不足50%，反复用药可引起蓄积。。本文重点关注药物说明口服小时等内容，您可以在本页对白消安进行讨论【关键字】烷化剂抗肿瘤药.药物.说明.口服.小时.白消安【全文】药物名称白消安药物别名白血福恩，马利兰，Busulphan，MYLERAM 英文名称 Busulfan说明片剂：每片0.5mg；2mg。功用作用 本品口服吸收良好，迅速分布到各组织中去， $t_{1/2}$ 约2~3小时。几乎所有药物经代谢后均以甲烷磺酸形式自尿中缓慢排出。24小时排出不足50%，反复用药可引起蓄积。但5例病人服用本品1mg/kg每6小时1次，连服4日，首剂后 $t_{1/2}$ 为3.4小时，末剂后 $t_{1/2}$ 为2.3小时。说明长期用药可促进自身代谢。临床适应证：本品主要治疗慢性粒细胞白血病。用法用量 口服，1日2~8mg，分3次服。维持量，1次0.5~2mg，1日1次。小儿每日0.05mg/kg。注意事项 主要不良反应为消化道反应及骨髓抑制，白细胞、血小板减少、骨髓抑制、肺纤维化。有的病人可有头昏、面红、男性乳腺发育或睾丸萎缩；妇女无月经，可能致畸胎。慢性粒细胞白血病急性变时应停药。用药期间应严格检查血象 100Test 下载频道开通，各类考试题目

直接下载。详细请访问 www.100test.com