

抗肿瘤药：烷化剂抗肿瘤药-塞替派 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/256/2021_2022__E6_8A_97_E8_82_BF_E7_98_A4_E8_c67_256528.htm 【摘要】塞替派属于烷化剂抗肿瘤药栏目，主要讲述了药物名称塞替派 药物别名 thiophosphoramide，tespamin，tspa 英文名称 thiotepa 说明注射液：每支10mg（1ml）。功用作用 临床适应证：临床上主要治疗卵巢癌、乳腺癌、膀胱癌和消化道癌。注射前应尽量抽出积液，膀胱内灌注：每次60mg，溶于生理盐水或注射用水30～60ml中，将尿排出后...。本文重点关注ml 药物 临床主要 等内容，您可以在本页对塞替派进行讨论【关键字】烷化剂抗肿瘤药.ml.药物.临床.主要.塞替派【全文】药物名称塞替派药物别名 thiophosphoramide，tespamin，tspa英文名称 thiotepa说明注射液：每支10mg（1ml）。功用作用 临床适应证：临床上主要治疗卵巢癌、乳腺癌、膀胱癌和消化道癌。用法用量 静脉或肌内注射：每次剂量0.2mg / kg，成人一般每次10mg，每日1次，连用5日后改为每周3次。目前多采用20～30mg每1～2周注射1次。总量200～300mg为1疗程，最多可给400mg。胸腹腔及心包腔内注射：每次10～50mg，每周1～2次。注射前应尽量抽出积液，膀胱内灌注：每次60mg，溶于生理盐水或注射用水30～60ml中，将尿排出后经导尿管注入，变换体位，保留2小时，每周1次，4周后改为每月1次，共10次。注意事项 主要为骨髓抑制、消化道反应，但一般较轻微，本品可引起男性病人无精子，女性无月经，少数病人尚可有发热、皮疹。用药期间应严格检查血象。稀释后如发现混浊，即不得使用。 100Test 下载频道开通，各类考试题目

直接下载。详细请访问 www.100test.com