

抗肿瘤药：烷化剂抗肿瘤药-六甲蜜胺 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/256/2021_2022__E6_8A_97_E8_82_BF_E7_98_A4_E8_c67_256529.htm 【摘要】六甲蜜胺属于烷化剂抗肿瘤药栏目，主要讲述了药物名称六甲蜜胺药物别名六甲三聚氰胺，Hexamethylmelamine，HEXALEN，HEXASTAT，HEXINAWAS，HMM英文名称 Altretamine 说明片（胶囊）剂：每片（胶囊）50mg。用法用量v口服：一般为每日300mg / m²，分4次服，14~21天为1疗程。与其他药物联合应用剂量为100~225mg / m²，每周期...。本文重点关注六甲药物胶囊一般等内容，您可以在本页对六甲蜜胺进行讨论【关键字】烷化剂抗肿瘤药.六甲.药物.胶囊.一般.六甲蜜胺【全文】药物名称六甲蜜胺药物别名六甲三聚氰胺，Hexamethylmelamine，HEXALEN，HEXASTAT，HEXINAWAS，HMM英文名称 Altretamine说明片（胶囊）剂：每片（胶囊）50mg；100mg。功用作用 临床适应证：卵巢癌、小细胞肺癌、恶性淋巴瘤、乳腺癌等。亦可用于治疗慢性粒细胞白血病，比较安全。用法用量v口服：一般为每日300mg / m²，分4次服，14~21天为1疗程；与其他药物联合应用剂量为100~225mg / m²，每周期为7~14天。在饭后1~1.5小时服药能减少胃肠道反应。注意事项（1）胃肠道反应：表现恶心、呕吐，一般不严重。（2）骨髓抑制：主要是白细胞下降，偶有血小板下降。（3）神经系统毒性：长期服用对中枢及周围神经系统有一定影响。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com