

西药麻醉用药：局部麻醉药利多卡因 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/272/2021\\_2022\\_\\_E8\\_A5\\_BF\\_E8\\_8D\\_AF\\_E9\\_BA\\_BB\\_E9\\_c23\\_272679.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/272/2021_2022__E8_A5_BF_E8_8D_AF_E9_BA_BB_E9_c23_272679.htm) 药物名称 利多卡因

药物别名 赛罗卡因，Lignocaine，XYLOCAINE英文名称

Lidocaine说明 注射液：每支0.1g（5ml）；0.4g（20ml）。功

用作用 局部麻醉作用较普鲁卡因强，维持时间比它长1倍，毒性也相应加大。穿透性、扩散性强，主要用于阻滞麻醉及硬膜外麻醉。尚具有抗心律失常作用，对室性心律失常疗效较好，作用时间短暂，无蓄积性，并不抑制心肌收缩力，治疗剂量下血压不降低。主要用于室性心动过速及频发室性早搏

用法用量（1）局部麻醉 阻滞麻醉用1%~2%溶液，每次用量不宜超过0.4g。表面麻醉用2%~4%溶液，喷雾或蘸药贴敷，1次不超过100mg。浸润麻醉用0.25%~0.5%溶液，每小时用量不超过0.4g。硬膜外麻醉用1%~2%溶液，每次用量不超过0.5g。（2）心律失常 每次静注1~2mg/kg，注射速度可较快。如无效，10~15分钟后可再注射同量一次，同时取100mg，加于5%~10%葡萄糖液100~200ml内作静滴，每小时不超过100mg。注意事项（1）静注时可有麻醉样感觉，头晕、眼发黑，若将药静滴，可使此症状减轻。（2）心、肝功能不全者，应适当减量。（3）禁用于二、三度房室传导阻滞、对本品过敏者、有癫痫大发作史者、肝功能严重不全者以及休克病人。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)