

抗肿瘤药:抗生素类抗肿瘤药阿霉素 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/291/2021_2022__E6_8A_97_E8_82_BF_E7_98_A4_E8_c67_291865.htm 药物名称 阿霉素药物别名 adriamycin，adriblastin，adm英文名称 doxorubicin说明注射用阿霉素：每瓶10mg，50mg。功用作用 阿霉素为广谱抗肿瘤抗生素，对急性白血病、淋巴瘤、乳腺癌、肺癌及多种其他实体肿瘤均有效。用法用量 一般主张间断给药，40~60mg / m²，每3周1次；也有人给予20~30mg / m²，每周1次，静脉注射。目前认为总量不宜超过450mg / m²，以免发生心脏毒性。注意事项 骨髓抑制、脱发、消化道反应均较常见；本品可引起心脏毒性，轻的表现为心电图室上性心动过速、室性期外收缩及st-t改变，重者可出现心肌炎而发生心力衰竭与所用总剂量相关，大多发生于总量超过400mg / m²的病人。与原先存在的心脏疾病无关。辅酶q10、维生素c、e等由于可清除自由基，可降低心脏毒性。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com