

亚急性甲状腺炎的表现 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/295/2021_2022__E4_BA_9A_E6_80_A5_E6_80_A7_E7_c67_295333.htm 本病发病前常有驱症状，主要为身体发热、全身不适、咽喉疼痛、颈部胀痛，有时有流涕等其他症状。继之甲状腺有明显肿大，并有压痛，开始时仅为一侧或一侧的某部分，不久就会累及两侧，部分病人可有颈后、耳后、甚至同侧手臂的放射痛。在病程早期，症状将近高峰时，可能有怕热、心悸、多汗等甲亢表现，早期由于甲状腺发炎后有较多甲状腺素释放之故。红细胞计数可能正常或略低，血沉明显增快，血清蛋白电泳可见白蛋白减少，而 和 球蛋白则常有增加。病变早期基础代谢率可升高到 + 30 ~ 50%，至病程后期可降低至 - 20%以下。如病变范围不大，患者的碘代谢情况可能无异常，但同位素扫描可见病变的吸¹³¹碘能力明显降低，但血清蛋白结合碘及T₄T₃值常有增加。这种分离现象是由于甲状腺释放了胶体，也释放了甲状腺素，但病变的甲状腺滤泡细胞还不能摄取碘以合成甲状腺素。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com