

服药不要随意超过剂量 PDF转换可能丢失图片或格式，建议  
阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/295/2021\\_2022\\_\\_E6\\_9C\\_8D\\_E8\\_8D\\_AF\\_E4\\_B8\\_8D\\_E8\\_c67\\_295335.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/295/2021_2022__E6_9C_8D_E8_8D_AF_E4_B8_8D_E8_c67_295335.htm) 一些人错误地认为，服药剂量越大，见效越快。宁夏食品药品监督管理局提醒，其实这是非常错误的，一般药物的疗效，不会因为剂量增加而提高，相反只会增加其肝肾功能的排泄负担，损害脏器。一种药的用量，是经过严格的科学实验和大量的临床观察而确定的，绝不是随意制定的。药物用量超出治疗剂量范围，轻则产生毒副作用，损害人体健康，重则危及生命。例如过量服用四环素等会损害肝脏；链霉素用量过大，可引起头晕、耳聋；庆大霉素用量过大，可引起尿蛋白和血尿等。常用的营养药多吃、超剂量服用，同样也没有好处。如超剂量服用鱼肝油或维生素A，会引起骨痛、皮肤发痒、毛发脱落、食欲减退等症状。中药及中成药也不宜超剂量服用。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)