

2010年儿科护理：小儿患急性化脓性中耳炎的护理 PDF转换
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/3/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_84_BF_c21_3304.htm 小儿患急性化脓性中耳炎的护理：

来源：考试大 患急性化脓性中耳炎的孩子，应遵照医嘱应用
抗生素，最好连续使用1周，有高热者可同时酌情用退热药。
在鼓膜尚未穿孔时，可用1%酚甘油，减少疼痛；已穿孔者，
则可用抗生素滴耳药，如0.5%卡那霉素或2.5%氯霉素，或滴
眼药水于耳内，每日滴3-4次，连续数天直至不流脓为止。但
滴药前应先用棉签擦去耳道内的脓液（可用过氧化氢即双氧水擦）
。滴药时，使病侧外耳孔向上让耳药在耳道内滞留数分钟，
以易于进入中耳内。在鼓膜没有愈合之前，应避免污水进入
耳道，故不宜游泳。小儿若反复发作化脓性中耳炎可能会影
响听力，故必须注意预防。在哺乳期，喂奶时应避免奶汁流
入耳道内；睡在床上爱哭的孩子，要防止泪水流入耳内；常
常感冒的小儿，不要用力擤鼻，以免影响耳咽管。更多信息
请访问：[百考试题护士网校](#) [护士论坛](#)
[护士在线题库](#) [护理学专业（护士）《相关专业
知识》全真模拟试汇总](#) [护理学专业（护士）《基础知识
》全真模拟试题](#) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下
载。详细请访问 www.100test.com