

十二指肠淤积症 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/303/2021_2022__E5_8D_81_E4_BA_8C_E6_8C_87_E8_c22_303629.htm

名称十二指肠淤积症

所属科室普通外科
诊断1.症状主要为上腹部疼痛和饱胀症状，多在进食过程中或进食后发生，恶心、呕吐胆汁样物，有时因上腹饱胀而自行设法呕吐以缓解症状。此症呈周期性反复发作，逐渐加重。常出现便秘。2.体征可见胃型及蠕动波，上腹振水音阳性，可闻及腹内拍水声和肠鸣音亢进。3.

辅助检查 钡餐检查可见十二指肠郁滞及扩张征象，或在十二指肠某处钡剂忽然受阻，有时可见逆蠕动。 胃镜可发现十二指肠腔内的梗阻原因及在梗阻部位胃镜进行受阻。 空腹抽取十二指肠液常可发现有食物残渣等。治疗1.非手术治疗

休息，抬高床脚，腹部按摩。抽吸冲洗十二指肠，进无渣而富营养的饮食，食后采取左侧卧位、俯卧位或胸膝位。内服阿托品、苯巴比妥等药可暂时收效。2.手术治疗 十二指肠空肠吻合术。适用于十二指肠第三段梗阻，手术要求空肠距屈氏韧带10~15cm，与胀大的十二指肠第三段吻合，吻合口至少为5cm，以防肠内容物通过不畅。 胃空肠吻合术。十二指肠四周粘连多，暴露困难时方可使用，以免发生肠瘘。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com