

疥疮 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/303/2021_2022__E7_96_A5_E7_96_AE_c22_303673.htm 名称疥疮所属科室皮肤科病因 疥螨
俗称疥虫，是一种皮内寄生虫，种类很多。人的疥疮主要由人疥螨引起，疥虫分雌雄两种，雌虫约400deg.

~ 20deg.-10°.) 稍加转动，疥虫即落入针口孔槽内，缓慢挑破皮肤出针（或直接退出）。移至有水（或10%KOH，NS）的玻片上，然后在显微镜下查疥虫。（三）刮片法对丘疹提倡用此法检查，先用消毒外科刀片沾少许矿物油，寻找新发的炎性丘疹，平刮数下以刮取丘疹顶部的角质部分，至油滴内有细小点为度，连刮6-7个丘疹后，移至载玻片，镜下可发现的常是幼虫，偶有虫卵及虫粪。本病应与以下疾病鉴别：

：1.痒疹：多自幼童开始发病。慢性病程，丘疹较大，好发于四肢伸侧。2.湿疹：为多形性皮损，常融合成片，倾向湿润渗出。无一定好发部位。3.虱病：损害以抓痕为主。指缝间无皮疹，在衣缝处可找到虱及虫卵。治疗一般外用10%硫磺软膏（婴幼儿5%硫磺软膏）。治疗前先用热水和肥皂洗澡，然后擦药，自颈以下，先搽皮损，后及全身，每日1-2次，连续3-4日为1疗程。搽药期间，不洗澡，不更衣，以保持药效，彻底消灭皮肤和衣服上的疥螨。疗程结束后，换用清洁衣服。两周后还发现新发皮疹者，应再重复第二疗程。25%苯甲酸苄酯乳剂的杀虫力强，又无刺激性，可每日搽药1-2次，共2-3天，效果较好。10% Lindane霜即r-666霜，是最常用和最有效的杀疥虫药。此剂不能用于婴幼儿（10岁以下）、妊娠和哺乳妇女及有癫痫发作或其他神经疾患的病人。其用法为用10% r-666霜从颈部以下全身涂搽，24小时全部洗去，

药物不可触及眼部及粘膜。预防及预后 注重个人清洁卫生。发现患者应立即隔离治疗，家中患者应同时治疗。未治愈前应避免和别人接触，包括握手。患者穿过的衣服，被褥等必须消毒或在阳光下晒 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com