

卵巢早衰 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/303/2021_2022__E5_8D_B5_E5_B7_A2_E6_97_A9_E8_c22_303698.htm 名称卵巢早衰所属科室妇产科临床表现 此症多发生在20~30岁妇女。患者可有正常生育史，然后无诱因而忽然出现闭经；也可先有月经过少而后长期闭经。少数病例在月经初潮后有1~2次月经即出现闭经，这种年轻患者常因**干枯、性交困难和不孕而就诊。由于雌激素低落，患者常诉更年期综合征的症状如面部潮红、出汗、烦躁等。检查染色体组型为46, xx。血雌激素水平低（常低于20pg/ml），血FSH与LH增高，FSH比LH上升更早更高。血催乳素正常。雌激素撤血试验常为阳性。卵巢活组织检查如发现尚有卵泡存在，则可能是卵巢缺乏FSH受体，对促性腺激素缺乏反应，这种情况称为卵巢不敏感综合征。由于卵巢不敏感综合征较少见，而且妊娠的机会很少，故一般不主张进行卵巢活检。如有条件，可检测卵巢组织抗体及抗肾上腺皮质抗体，以发现有关的自身免疫疾病。治疗患者常需要少量的雌激素，或雌、孕激素周期治疗，不但可消除更年期综合征，而且可预防骨质疏松。过去，认为卵巢早衰患者，不可能恢复生育机能，重庆医科大学报道的29例卵巢早衰病例中，采用小剂量的雌激素治疗后有2例获得妊娠，其中1例6个月妊娠时流产。此2例可能属卵巢不敏感综合征，经小剂量雌激素治疗后，增加了颗粒细胞的敏感性，从而使存留的少数卵泡恢复了正常发育、成熟以致排卵。因此，对高FSH而染色体组型正常的年轻患者，不宜放弃促排卵的治疗。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com