

尿道粘膜脱垂 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/303/2021\\_2022\\_\\_E5\\_B0\\_BF\\_E9\\_81\\_93\\_E7\\_B2\\_98\\_E8\\_c22\\_303814.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/303/2021_2022__E5_B0_BF_E9_81_93_E7_B2_98_E8_c22_303814.htm) 名称尿道粘膜脱垂所属科室妇产科病因 主要是由于尿道壁的薄弱，可因先天发育不良、分娩损伤、绝经后尿道四周组织萎缩或全身衰弱所致。可在腹内压忽然增加（如剧烈咳嗽、忽然负重）后忽然发生，亦可是缓慢起病逐渐发生的。临床表现 往往表现在尿道口部位的肿物，部分性脱垂者肿物位于尿道口后侧，完全性脱垂者粘膜呈环状脱出，而尿道口则位于肿物中心，肿物直径约为1~5cm，颜色由鲜红转为暗红乃至青紫色，常伴有浆液血性渗出液。轻者常有局部灼痛感并有尿频和尿痛，症状宛似尿道肉阜。重者可出现排尿困难并因血栓形成、组织坏死，引起剧烈疼痛。诊断 需要与尿道肉阜和尿道肿瘤等进行鉴别，必要时可作活组织检查以明确诊断。治疗 症状明显者可将脱垂的尿道粘膜切除，尿道口过于松弛的可在粘膜下行折迭缝合，最后将粘膜断端和前庭重新吻合。病变较轻的部分脱垂患者，可行坐浴及外敷收敛药物以减轻症状。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)