

妊娠子宫扭转 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/303/2021_2022__E5_A6_8A_E5_A8_A0_E5_AD_90_E5_c22_303815.htm 名称妊娠子宫扭转
所属科室妇产科病因 妊娠子宫，尤其在妊娠晚期时，都伴有不同程度的右旋，但旋转角度不超过30deg.，同时伴有腹痛等症状者称妊娠子宫扭转（tor-sion of the pregnant uterus）。妊娠子宫扭转在家畜中较为多见，因是双角子宫的缘故，但在人类极为罕见。盆腔的病理改变是引起妊娠子宫扭转的基础。Nesbitt等（1956）在收集文献所报道妊娠子宫扭转同时伴有症状的107例中，发现盆腔的病理改变主要为子宫肌瘤、双角子宫和横位，约占所有妊娠子宫扭转病例的60%以上，这三者的共同特点是使妊娠子宫左右两侧的重量不均、故易致扭转；其余为卵巢肿瘤合并妊娠、盆腔粘连、脊柱畸形及其他类型的胎位不正等；约有21%的病例，盆腔并无病理性改变。忽然的体位改变、不良的姿势以及胎动等，则往往是引起妊娠子宫扭转的直接诱因。临床表现 本症的主要症状为腹痛，95%的病例都有不同程度的腹痛；腹痛的程度与扭转后所造成的子宫缺血成正比，故扭转的程度越大、时间越久、则子宫缺血越严重，而腹痛也就越剧烈。扭转的程度可达90deg.。Nesbitt所收集的107例中扭转大于180deg.者在常规切口开腹后正中处可见充盈曲张的子宫血管；扭转180times.6cm大的肿块。右下腹有压痛、反跳痛及肌痉挛。诊断为右侧子宫间质部妊娠或子宫肌瘤变性，而行急症手术。手术时见子宫略呈紫蓝色，扭转180deg.。假如妊娠子宫不论向右或向左旋转超过90°.，同时伴有腹痛等症状者称妊娠子宫扭转（tor-sion of the pregnant uterus）。妊娠子宫扭转

在家畜中较为多见，因是双角子宫的缘故，但在人类极为罕见。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com