

卵巢囊肿 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/303/2021\\_2022\\_\\_E5\\_8D\\_B5\\_E5\\_B7\\_A2\\_E5\\_9B\\_8A\\_E8\\_c22\\_303859.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/303/2021_2022__E5_8D_B5_E5_B7_A2_E5_9B_8A_E8_c22_303859.htm) 名称卵巢囊肿所属科

室妇产科临床表现 卵泡囊肿时，病牛一向发情不正常，发情周期变短，而发情期延长，或者出现持续而强烈的发情现象，成为慕雄狂。母牛极度不安，大声哞叫，食欲减退，频繁排粪排尿，经常追逐或爬跨其他母牛。病牛性情凶恶，有时攻击人畜。直肠检查时，通常可发现卵巢增大，在卵巢上有1个或2个以上的大囊肿，略带波动。黄体囊肿时主要表现是母牛不发情。直肠检查时，卵巢体积增大，可摸到带有波动的囊肿。为了鉴别诊断，可间隔一定时间进行复查，如超过一个发情期以上没有变化，母牛仍不发情，可以确诊。治疗近年来多采用激素疗法治疗囊肿，效果良好。

1. 促性腺激素释放激素类似物 乳牛每次肌肉注射400mg，4次，但总量不得超过3000微克。一般在用药后15~20天恢复正常发情。如用药1周后未见好转，可第二次用药，剂量比第一次稍增大。
3. 绒毛膜促性腺激素 具有促使黄体形成的作用。牛静脉注射2500~3000国际单位或肌肉注射0.5万—1万国际单位，溶于5毫升蒸馏水中。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)