

结肠息肉 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/303/2021\\_2022\\_\\_E7\\_BB\\_93\\_E8\\_82\\_A0\\_E6\\_81\\_AF\\_E8\\_c22\\_303873.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/303/2021_2022__E7_BB_93_E8_82_A0_E6_81_AF_E8_c22_303873.htm) 名称结肠息肉所属科室普通外科诊断1.便血或粘液样便，可有里急后重，便秘或排便次数增多。低位蒂长息肉可随排便时脱出肛外。2.肛指检查，可触及低位息肉。3.钡剂灌肠可显示单个或多个充盈缺损。4.纤维结肠镜检查，可直接窥见病变的外形、大小、范围，并通过活组织检查明确息肉性质。治疗1.低位带蒂息肉，可结扎切除。无蒂而直径 < 1.0cm者，可直接电灼切除。2.高位带蒂息肉，可在纤维结肠镜下高频电切除。3.息肉较大，不规则，基底广，可经腹作肠段切除。4.息肉一旦癌变，则应按结肠癌行根治性手术。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)