

家族性结肠息肉病 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/303/2021_2022__E5_AE_B6_E6_97_8F_E6_80_A7_E7_c22_303878.htm 名称家族性结肠息肉

病所属科室普通外科临床表现1.大便带粘液血便，便次增多。2.消瘦，乏力，贫血及程度不同的腹部不适或腹痛。3或伴软骨瘤等肠道外肿瘤。4.息肉位于大肠为主。5.***指诊可触及息肉。诊断1.有阳性家族史。2.常有便血、大便次数增多，且粪便带有较多粘液。出现消瘦、乏力、贫血等，有不同程度的腹部不适或腹痛。3.肛指检查，可触及大小不一的息肉。4.结肠镜检查，可见直肠、结肠布满息肉，活检可确诊。5.钡剂灌肠可见多处充盈缺损。治疗治疗原则 1.单纯结肠或结肠息肉为主，可行全结肠切除，回肠腹部造瘘或回肠贮袋成形直肠吻合术，定期随诊，检查直肠残端粘膜情况。2.全结肠切除加直肠粘膜剥除，回肠贮袋成形，直肠鞘内肛管吻合术。3.伴有全消化道息肉无法根治者，当出现肠套叠，大出血等并发症时可作部分肠切除术。4.对症支持疗法。5.中医中药内服外治灌肠等。用药原则 1.不能手术者可用庆大霉素、灭滴灵、一般止血药物，维生素及中药口服及灌肠治疗。2.局限于大肠息肉可行手术切除。3.出现并发症或息肉恶变应作病变肠段切除时，需用rdquo.、rdquo.、rdquo.项中、输液、抗生素、止血药、维生素等药物治疗。A 氨甲苯酸 A 甲硝唑 A 硫酸庆大霉素 B 氯化钾 B 葡萄糖 B 维生素C C 人血白蛋白 C 复方氨基酸 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com