

丘疹性荨麻疹 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/304/2021_2022__E4_B8_98_E7_96_B9_E6_80_A7_E8_c22_304618.htm 名称丘疹性荨麻疹所属科室皮肤科病因多由于某些节肢动物如蚊、蚤、螨、蠓、臭虫等的叮咬所致的变态反应，亦有由于消化障碍，对某些食物的过敏而引起。临床表现发生于暖和季节。多见于儿童。皮损为1~2cm大的淡红色风团样丘疹，略呈纺锤形，中心可有小水疱，有时可演变为大疱。常分批发生于腹、腰背、臀及双小腿，多群集而较少融合。若发生于四肢远端者可形成大疱。自觉瘙痒。3~7天后皮疹逐渐消退，可遗留色素沉着，但可继续发生，经数周后始渐愈。患者一般无全身症状，有继发感染时，可有淋巴结肿大及发热。一般年龄稍大（7~8岁）可症状减轻及停止发生。诊断根据风团样丘疹，顶端有小疱的特点，一般不难诊断。应与水痘鉴别。水痘数目较多，损害为红斑、丘疹及水疱，散发于头皮、面部、躯干及四肢，口腔粘膜亦可累及，伴有轻度至中度全身症状。治疗应积极寻找病因并去除之，如避免进食引起过敏的食物，注重灭蚤、螨、蠓等动物。治疗一般内服抗组胺药物，外搽炉甘石洗剂等。继发感染时可外搽0.5%新霉素软膏，必要时加服抗感染药物。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com