

肘关节骨化肌炎 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/304/2021_2022__E8_82_98_E5_85_B3_E8_8A_82_E9_c22_304622.htm

名称肘关节骨化肌炎
所属科室骨科
诊断有明确外伤史；伤后反复被动屈伸关节；关节肿胀、疼痛持续不消伴局部温度升高；关节活动范围逐渐变小；X线早期无非凡，3~4周后关节四周发现云雾状的骨化团，晚期骨化范围缩小，密度增高，界限清楚。一般伤后3~6周内增大趋势，6~8周后趋于稳定。

治疗

- 1.一般治疗：骨化性肌炎诊断确立后，肘关节应妥善加以保护，是否行主动关节活动锻炼要视情况而定，如局部有肿胀、压痛及温度增高，活动时疼痛加重，则不应过度活动；如上述症状不明显，则应在疼痛可忍受情况下锻炼，以保留一定程度的关节活动和功能。
- 2.放射治疗：有人认为放射治疗能影响炎症反应过程，可防止骨化性肌炎发生。每周2次，4周一个疗程，每次200R。
- 3.手术治疗：凡影响肘关节屈伸功能，而骨化性肌炎处于静止者，即异位骨化致密硬化，界限清楚者，方可考虑手术切除。切除的目的是不使任何与骨化块有关的肌、骨组织残留，以防止复发；切除时宜切除骨化块连同一薄层正常肌肉，彻底止血。术后石膏固定1~3周。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com