

桑毛虫皮炎 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/304/2021_2022__E6_A1_91_E6_AF_9B_E8_99_AB_E7_c22_304627.htm 名称桑毛虫皮炎所属科室皮肤科病因 桑毛虫皮炎桑毛虫是桑毒蛾的幼虫，嗜食桑叶及各种果树、柳、榆等树叶，故本病常见于从事桑园或果园劳动者。桑毛虫盛发期为6~10月份。幼虫躯体上生有毒毛，一条成熟的幼虫毒毛可高达200万~300万根。毒毛呈箭针形，长45~315 μm ，毛根基部如针尖，极易从虫体上脱落。毒毛中空，成管道状，内含毒液，毒毛常随风到处飘散，若落在皮肤上，毛尖端刺入皮肤，于数分钟至数小时之内即可引起皮炎。临床表现 本病多见于夏秋季，非凡是天气炎热、干旱、风大，有利于毒毛的散播，且此时人们又多穿短袖汗衫在户外活动，受到毒毛侵袭机会更多，故在同一地区往往成批发病。皮疹多见于颈项、肩、上背、上胸和四肢屈面。基本损害以绿豆至黄豆大水肿性斑丘疹、丘疹为主，色淡红或鲜红，少数为丘疱疹，顶端常有一毒毛刺伤痕迹。一般疏散分布。自觉剧痒。尤以夜间为甚。病程一般约一周左右。若毒毛附着于眼睑，因揉搓进入眼内可引起结膜炎。诊断在皮疹处检出桑毛虫毒毛有助于确定诊断，其方法是用放大镜检查皮疹寻找毒毛，或用透明胶带在皮疹处反复粘贴，然后贴在载玻片上，加一滴二甲苯后，盖上盖玻片镜检。治疗治疗为局部外搽消炎止痒剂。可用橡皮膏反复粘贴患处以粘去残留在皮肤上的毒毛，避免搔抓等再刺激。酌情内服抗组胺药物。预防及预后 预防应及早消灭越冬和早春桑毛虫，常用敌百虫等喷杀，喷杀多角体病毒及保护天敌进行生物灭虫。在有桑毛虫的树下或树上劳动时，需注重风向，穿戴防护

衣帽。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细
请访问 www.100test.com