

寻常疣 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/304/2021_2022__E5_AF_BB_E5_B8_B8_E7_96_A3_c22_304663.htm

名称平常疣所属科室皮肤科病因 光镜下示角化过度、角化不全，颗粒层有空泡样细胞，并含有核内嗜碱性包涵体，棘层肥厚和乳头瘤样增生。增生上部有层叠角化不全细胞，核呈深嗜碱性，电镜下可见核内病毒颗粒。临床表现 皮损为针头至豌豆大，半圆形或多角形丘疹，质地硬，表面粗糙，角化明显，呈灰褐色或正常肤色，顶端可呈乳头样增生，四周无炎症。初发时多为单个，可因自身接种而增多至数个或数十个。一般无自觉症状，偶有压痛，摩擦或撞击时易出血。好发于手背、手指、足、甲缘等处。后者称甲周疣（periungualwart），有触痛，易致皸裂而感染。疣体呈细长丝状突起、顶端角化者，称丝状疣（filiform wart），好发于颈部或眼睑，常单发。有的疣体表面呈参差不齐的指状突起，称指状疣（digitate wart），亦多见于面部。治疗 1．局部治疗数目少时可仅采取局部治疗。（1）用刮匙将疣体刮除。（2）5-氟尿嘧啶或***丁胺（phthiobuZonum）软膏外涂，2次/日。（3）中药鸦胆子去壳捣碎，外敷，以护创膏固定，隔日一次。（4）CO₂激光烧灼或液氮冷冻治疗，注重尽量少损及真皮层及避免术后继发感染。2．全身治疗数目多时可内服中药，以养阴平肝、活血软坚为治则。常用处方为灵磁石30g、生牡蛎30g、珍珠母15g、代赭石15g、赤芍6g、红花9g、郁金8g、蜂房2g、白僵蚕9g、每日一剂，煎服。月经期及孕妇忌服。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com