

剥脱性骨软骨炎 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/304/2021_2022__E5_89_A5_E8_84_B1_E6_80_A7_E9_c22_304779.htm

名称剥脱性骨软骨炎
所属科室骨科
临床表现 好发于16~25岁之间的男性，膝、肘关节常见，髌、肩、踝或跖趾关节也可见到。通常侵蚀一个关节，无全身症状。可有关节钝痛、活动加重，休息减轻，关节肿胀轻。游离体可出现关节绞锁、血肿和创伤性关节炎。可查到关节肿胀、积液、压痛、触及包块，活动受限可闻捻发音。肌肉萎缩。股骨内髌和外髌、髌骨关节面、肱骨外髌、桡骨小头、踝关节的距骨内上均可发病，可引出压痛。辅助检查 因碎片主要为软骨，早期X线多无发现，如碎片大可见关节面缺损或透亮界线。所以游离体多小于实际大小（外包软骨缘故）。晚期关节增生性改变。鉴别诊断应与骨端无菌坏死症和早期边缘性骨结核鉴别。治疗 未分离碎片，采用非手术疗法3~6个月，如石膏固定、股四头肌练习、服维生素C、D和钙片等。非手术疗法对16岁以下儿童疗效尚好，成人疗效不佳。游离体宜早期手术摘除，避免损伤关节。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com