

子宫内膜炎 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/304/2021_2022__E5_AD_90_E5_AE_AB_E5_86_85_E8_c22_304791.htm 名称子宫内膜炎所属
科室妇产科病因 子宫体部的炎症以子宫内膜炎为主，当炎症发展至严重阶段时可影响子宫肌层，成为子宫肌炎，后者是内膜炎的延伸，无子宫内膜炎的单纯子宫肌炎基本上不存在。宫腔积脓并不常见，故轻易被忽略或误诊。不论是急性或慢性子宫内膜炎所导致的宫颈阻塞，如宫腔内的炎性分泌物不能外流或引流不畅，即可形成宫腔积脓。造成宫颈管狭窄阻塞的原因可能与宫颈恶性肿瘤、尤其是应用过镭疗者，宫颈电烙、冷冻或宫颈锥切、严重的慢性宫颈炎、***炎所导致的疤痕形成，以及老年妇女的宫颈萎缩等有关。临床表现患者的主要症状是下腹坠痛、发热。但由于慢性子宫内膜炎而逐渐形成的宫腔积脓也可以无明显症状。作妇科检查时可发现子宫增大，柔软，有触痛，宫旁结缔组织可有明显增厚，并可有附件的炎性包块同时存在。老年妇女如有以上情况尤应想到有宫腔积脓的存在。诊断以宫腔探针探入宫腔时，如有脓液流出，诊断即可确立，但应同时轻取宫腔组织以了解有无恶性肿瘤存在。有时由于宫颈管疤痕较多，宫颈管弯曲，以致探针亦不易插入，故需耐心操作。一旦诊断确立，将宫颈扩张，脓液即可顺利外流。如引流不够满足可在宫颈管内放置橡皮管引流，以防止颈管在短期内又发生阻塞，影响脓液的排出。治疗如引流通畅，症状即迅速消失，抗生素的应用与否，可根据引流后的疗效而定。对老年患者，可给以乙烯雌酚，日服1mg共用7~10天。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com