

纹状骨瘤 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/304/2021\\_2022\\_\\_E7\\_BA\\_B9\\_E7\\_8A\\_B6\\_E9\\_AA\\_A8\\_E7\\_c22\\_304795.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/304/2021_2022__E7_BA_B9_E7_8A_B6_E9_AA_A8_E7_c22_304795.htm) 名称纹状骨瘤所属科室骨科病理 显微镜下见这种条纹是松质骨组织的凝集，结构上并无异常。骨的其他成份无病理性表现。临床表现 无症状。偶有关节轻度疼痛。肢体偶有长短不齐。但是否与本病有关则不明。X线表现为特征性。在全身大多数骨骼上，可见线状或带状的密的条纹，自干骺端开始，一直延伸至骨干中段与长轴平行。在条纹之间，有密度减低区，条纹亦可进入骨骺。头颅、手及锁骨常不受侵犯，但跟骨及距骨可受累。在髌骨上的表现有特征性。自髌臼上方向髌嵴作扇形的放射状排列，有时亦可以呈斑块状或斑点状。骨皮质较正常稍增密，但无破坏。这种条纹的密度可以逐渐增加占至整个干骺端。诊断 其诊断完全依靠X线。且大多数为偶然发现。骨质出现条纹的情况，在其他疾病亦有，应除外。骨硬化病（大理石骨症），软骨发育异常（Ollier病）和肢骨纹状肥大，脆弱性骨硬化及Englemann等病。治疗本病无症状，亦不影响功能，故无需治疗。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)