

骨盆直肠脓肿 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/304/2021_2022__E9_AA_A8_E7_9B_86_E7_9B_B4_E8_c22_304831.htm 名称骨盆直肠脓肿所属科室普通外科诊断感染常由直肠炎、直肠溃疡和直肠外伤所致，也可由肌间脓肿或坐骨直肠窝脓肿波及。发病缓慢，早期自觉症状仅为直肠内坠胀，排粪时尤感不适，有时有排尿困难。检查：***四周多无异常，但直肠指诊可发现在直肠上部的前侧壁外有浸润、压痛、隆起、甚至波动。诊断主要靠穿刺抽脓，以手指在直肠定位，从***四周皮肤进针穿刺。必要时作肛管超声检查协助诊断。治疗手术切口同坐骨直肠窝脓肿，但稍偏后且略长。左食指伸入直肠内探查脓肿位置并做引导，另一手持弯曲管钳经过皮肤切口，穿过肛提肌进入脓腔，按前后方向撑开排出脓液，再用右食指插入脓腔，分开肛提肌纤维，扩大引流，冲洗脓腔后，放入软橡皮管或卷烟引流，并用安全另针固定，防止其滑入脓腔内（图1）。图1 骨盆直肠窝脓肿切开引流 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com