

自身敏感性皮炎 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/304/2021_2022__E8_87_AA_E8_BA_AB_E6_95_8F_E6_c22_304854.htm 名称自身敏感性皮炎

所属科室皮肤科病因 本病的病因尚不十分清楚。发病前，在皮肤某部常有湿疹样损害，由于过度搔抓、外用药物刺激或并发化脓感染而使原有损害恶化，红肿。皮肤上平行排列的糜烂、渗出明显增加，加之处理不当，创面不洁，组织分解物、细菌产物等形成一种非凡的自身抗原，被吸收发生致敏作用而引起全身泛发。临床表现 本病常忽然泛发多数或群集性红斑、丘疹、丘疱疹及小水疱，可互相融合，泛发或对称分布。有时可有玫瑰糠疹样红斑，并可见沿搔抓部呈平行线状排列丘疱疹、水疱，自觉瘙痒剧烈。从原发皮损至全身泛发一般需经7~10天左右。诊断 本病有典型的原发活动性湿疹样损害史，以后泛发全身，呈对称性丘疹、丘疱疹、水疱。对原发损害、继发感染进行治疗，减少化学物质的刺激及接触过敏或用皮质类固醇制剂治疗后，症状显著好转可为诊断依据。治疗 根据皮疹的炎症、有无溃疡、有无化脓感染给予湿敷，氧化锌油外用。内用抗生素，必要时予以小量皮质类固醇激素，能较快控制症状。但有时急性症状消退后，常有一段类似亚急性湿疹反复发作的过程，可进行对症治疗。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com