

褶皱 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/304/2021_2022__E8_A4_B6_E7_83_82_c22_304869.htm 名称褶皱所属科室皮肤科病因 由于皮肤皱褶处积汗潮湿，角质层易被浸软，加上经常与对侧皮肤摩擦而发生本病。临床表现 本病多见于湿热季节，好发于婴儿和体胖成人。在颈部、腋窝、腹股沟、臀沟、四肢关节屈面和妇女乳房下等处的皱襞处出现潮湿鲜红或暗红色斑，范围与相互摩擦的皮肤皱襞面一致。自觉痒感或灼痛。患处轻度肿胀，表皮浸渍发白，剥脱，糜烂面上有浆液渗出。由于浆液物分解及细菌滋生，可发出臭味。若继发念珠菌感染，则四周有散在丘疹及水疱，若继发细菌感染，则有脓性分泌物。诊断 根据混热季节发病，在皱襞部位的红斑糜烂等特点，易于诊断。治疗 皮肤皱襞处应经常清洗，保持干燥清洁或扑以粉剂，减少汗液浸渍摩擦。在红斑期仅用扑粉即可，糜烂处可搽40%氧化锌油或用3%硼酸溶液湿敷。若有细菌感染，则应用0.5%黄连素液清洗；若有念珠菌感染，可用含制霉菌素或其它抗真菌药的粉剂。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com