

外阴尖锐湿疣 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/304/2021_2022__E5_A4_96_E9_98_B4_E5_B0_96_E9_c22_304884.htm 名称外阴尖锐湿疣所属科室皮肤科临床表现 大小阴唇、会阴及**四周均为好发部位，并可向四面扩散。初发为数个微小、淡红色丘疹，逐渐增大，增多，倾向融合或互相重叠，呈大小不等的乳头样、蕈状或鸡冠状突起。质柔软，暗红或污灰色，表面湿润、糜烂，可分泌混浊的浆液或脓液。初发时常无自觉症状，增大后可有搔痒及压迫感。尖锐湿疣偶可发生恶变。诊断 尖锐湿疣应与扁平湿疣-二期梅毒疹鉴别。后者往往伴有其他梅毒症状，病损呈扁平状，病变部可查到梅毒螺旋体，梅毒血清反应强阳性。根据临床表现不难诊断。必要时需作活检除外癌。尖锐湿疣的组织结构呈树枝状，表面覆以鳞状上皮，角质层略增厚，多为角化不全细胞，棘细胞层显著增厚、水肿。真皮内有慢性炎症细胞浸润。治疗 主要为局部治疗。根据引起湿疣生长的病因，积极治疗外阴炎、**炎和宫颈炎。注重外阴卫生，保持清洁、干燥。1 5000高锰酸钾或2~4%硼酸液坐浴，每日1~2次。小的病损可用石炭酸、三氯醋酸、雷锁辛或20~25%鬼臼树脂（podophyllum）腐蚀，每5~7天一次。点涂时应注重保护四周皮肤。较大的或多发湿疣可在局麻下电灼切除。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com