

非淋菌性尿道炎 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/304/2021_2022__E9_9D_9E_E6_B7_8B_E8_8F_8C_E6_c22_304929.htm 名称非淋菌性尿道炎

所属科室皮肤科诊断 一、有婚外性接触史或配偶感染史，潜伏期1周~3周。二、临床表现 男性常有尿道内刺痒、烧灼感、刺痛，有时尿急及排尿困难。但症状一般比淋病轻。尿道口充血或红肿，有浆液性、粘液脓性或白色稀薄分泌物，或晨起有“现象”。女性发生尿道炎可有尿频、尿急或排尿困难；宫颈炎则白带增多，宫颈充血或红肿、糜烂；***及外阴瘙痒等。无论男性或女性有很多病人无任何症状或症状很轻微，尤以女性为多。三、本病可经产道传染，引起新生儿眼结膜炎、肺炎、鼻炎、中耳炎和女婴的***炎。四、合并症 男性主要合并症为附睾丸炎，前列腺炎及Reiter综合征等；女性主要为输卵管炎、盆腔炎、异位妊娠及不育症等。五、化验检查（一）分泌物涂片和培养淋球菌均为阴性，而涂片镜检，在油镜（1000倍）视野下多形核白细胞超过4个或者晨尿，前段尿15毫升沉淀，在高倍（400倍）视野下，每视野多形核白细胞超过15个，有诊断意义。（二）有条件可作沙眼衣原体、解脲支原体等病原学检查。鉴别诊断 本病主要应与淋菌性尿道炎相鉴别，后者潜伏期较短，平均3天~5天，尿痛比较严重，分泌物多为脓性，量多，淋球菌检查阳性，而NGU的分泌物多为浆液性或粘液脓性，较稀薄，量少。查不出淋球菌。治疗 一、四环素 500毫克，每日4次口服，至少连用7天，一般为2周~3周，也可在7天后改为250毫克，每日4次，服至21天。二、强力霉素 100毫克，每日2次口服，

连服7天~14天。三、二甲胺四环素（美满霉素）100毫克，每日2次口服，连服7天~14天。四、土霉素250毫克每日4次口服，连服7天~14天。五、氧氟沙星200毫克，每日2次~3次口服，连服7天~14天。六、罗红霉素150毫克，每日2次口服，连服7天。七、阿齐霉素1克顿服。八、红霉素500毫克，每日4次口服，连服7天。新生儿眼结膜炎或肺炎，每日50毫克/千克，分4次口服，连服10天~14天。儿童体重>45千克按成人剂量，体重<45千克，每日50毫克/千克，分4次口服，连服10天~14天。九、中药双黄连粉针剂每日60毫克/千克，加于生理盐水500毫升中静脉滴注，每日1次，连用10天。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com