

脂溢性皮炎 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/304/2021_2022__E8_84_82_E6_BA_A2_E6_80_A7_E7_c22_304951.htm 名称脂溢性皮炎所属
科室皮肤科病因 原因尚不清楚,推测由于皮脂分泌增多和化学成分的改变，使原存在于皮肤上的正常菌群如卵圆形糠秕孢子菌等大量繁殖，原发或继发性侵犯皮肤所致。精神因素、饮食因素、饮食习惯、嗜酒等对本病的发生发展均可能有一定的影响。临床表现 本病初发皮损表现为毛囊四周红色小丘疹，逐渐融合成大小不等的黄红色斑片，其上覆有油腻性鳞屑结痂。重者可呈轻度渗出性湿疹样皮炎，局限某一部位或泛发，甚至发展为红皮病。好发部位为头皮、耳部、鼻唇沟、眉、眼睑、胸背中部、脐窝及腹股沟或腋下等皮脂溢出区，病程慢性，自觉不同程度的瘙痒。诊断 好发于皮脂溢出区，典型损害为带油腻性鳞屑的黄红色斑片，有不同程度的瘙痒，慢性经过。一般应与头部银屑病、湿疹、体癣相鉴别治疗 内服维生素B6、B2和复合维生素B，炎症著明或炎症范围较大时可短期给予皮质类固醇激素，如强的松10mg，每日2~3次，四环素0.25g，每日2次。外用1%煤焦油霜剂或氢化可的松等皮质类固醇霜或溶肌液或含有2%酮康唑的复方制剂，头部损害可用含有二硫化硒、酮康唑或煤焦油的香波洗头，每周2~3次 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com