

子宫颈息肉 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/305/2021_2022__E5_AD_90_E5_AE_AB_E9_A2_88_E6_c22_305386.htm 名称子宫颈息肉所属科室妇产科临床表现息肉极小时常无症状，多因其它妇科病在进行妇科检查时发现。较大息肉能引起白带增多、白带有血丝或血性白带，接触性出血，非凡在性生活或大使用力后可以发生少量出血。这些症状与早期宫颈癌相似。诊断宫颈息肉的诊断并不难，一般根据临床表现，医生通过窥阴器、镜等方法暴露宫颈后就能发现，如今好的镜设备已经能将病变部位放大10 - 40倍，在镜下准确摘除并送病变部位活检，根据组织学检查结果即能确诊，大大提高了诊断的正确率，也减少了不必要的处理方法。预防及预后 宫颈息肉有0.2% ~ 0.4%的恶变率，虽然很低，也应该及时摘除并做病理切片检查。另外，息肉虽然摘除，但宫颈的炎症并未彻底消除，而且发生于宫颈***部的息肉虽然位置表浅，但基底部较宽，治疗有时不轻易彻底切除，因此息肉还有可能复发，患者仍需要定期复查。杜绝和积极治疗及宫颈的急慢性炎症是预防宫颈息肉最有效的办法。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com