

中国药典2000版一部：小青龙合剂 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/467/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_8D_AF_E5_c67_467568.htm 【全文】

中药名称小青龙合剂拼音名Xiaoqinglong Heji性状本品为棕黑色的液体；气微香，味甜、微辛。鉴别(2)项下的供试品溶液及上述对照药材溶液、对照品溶液各1 μl，分别点于同一用1%氢氧化钠溶液制备的硅胶G薄层板上，以醋酸乙酯 - 甲酸 - 冰醋酸 - 水(15:1:1:2)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以10%硫酸乙醇溶液，在105℃加热至斑点显色清晰，置紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中，分别与对照药材及对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。处方麻黄125g 桂枝125g 白芍125g 干姜125g 细辛62g 甘草(蜜炙)125g 法半夏188g 五味子125g 制法以上八味，细辛、桂枝提取挥发油，蒸馏后的水溶液另器收集；药渣与白芍、麻黄、五味子、甘草加水煎煮至味尽，合并煎液，滤过，滤液和蒸馏后的水溶液合并，浓缩至约1000ml。法半夏、干姜照流浸膏剂与浸膏剂项下的渗漉法(附录O)，用70%乙醇作溶剂，浸渍24小时后进行渗漉，漉液浓缩后与上述药液合并，静置，滤过，滤液浓缩至1000ml，加入苯甲酸钠3g与细辛、桂枝挥发油，搅匀，即得。检查应符合合剂项下有关的各项规定(附录J)。功能与主治解表化饮，止咳平喘。用于风寒水饮，恶寒发热，无汗，喘咳痰稀。用法与用量口服，一次10~20ml，一日3次，用时摇匀。贮藏遮光，密闭。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com