

2007年临床执业医师资格考试第三单元试题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/493/2021\\_2022\\_2007\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_B4\\_c67\\_493440.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/493/2021_2022_2007_E5_B9_B4_E4_B8_B4_c67_493440.htm)

1. 下列临床表现与急性肾小球肾炎不符合的是 A. 链球菌感染后两周出现血尿、蛋白尿 B. 病程中出现C3下降 C. 高血压持续2个月以上 D. 可并发心力衰竭 E. 部分患者可有ASO水平升高

2. 最常见出现ANCA(中性粒细胞胞浆抗体)阳性的肾病是: A. 急进性肾小球肾炎 B. 急性肾小球肾炎 C. 狼疮肾炎 D. 急性间质性肾炎 E. 急性肾小管坏死

3. 对鉴别是否肾小球源性血尿最有意义的是 A. 全程血尿 B. 合并尿道刺激症 C. 尿潜血阳性 D. 肉眼血尿 E. 变形红细胞血

4. 血中补体水平下降一般不见于 A. 急进性肾小球肾炎 B. 膜性肾病 C. 系膜增生性肾小球肾炎 D. 狼疮肾炎 E. 急性肾小球肾炎

5. 属于激素冲击治疗的适应证是 A. 新月体肾炎 B. 毛细血管内增生性肾小球肾炎 C. 系膜增生性肾小球肾炎 D. 局灶节段性肾小球肾炎 E. 急性间质性肾炎

6. 肾病综合症合并有大脑血栓形成的患者，下列药物治疗中作用肯定的是 A. 阿司匹林 B. 双嘧达莫 C. 低分子肝素 D. 低分子右旋糖酐 E. 氯吡格雷

7. 急性肾功能衰竭，高钾血症患者，心率40次/分，应首先采取的治疗措施是 A. 静脉点滴5%碳酸氢钠 B. 静脉点滴10%葡萄糖胰岛素 C. 口服降钾树脂 D. 静脉注射10%葡萄糖酸钙 E. 血液透析

8. 下述检查结果对区分上、下尿路感染没有意义的是 A. 尿白细胞管型 B. B超示肾盂形态异常 C. 膀胱穿刺培养示大肠杆菌 D. 肾区叩痛 E. 外周血WBC明显升高

9. 口服铁剂治疗有效的缺铁性贫血患者，下列化验最先上升的是 A. 网织红细胞 B. 血红蛋白 C. MCV D. MCH E. MCHC

10. 下列有关再生障碍性贫血

血发病机制的检查结果，错误的是 A. 血清IL-2水平增高 B. 血清TNF水平增高 C. CD4 T细胞增高 D. CD8 T细胞增高 E. CD25 T细胞增高 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)