

复习指导：拂炎使用方法执业医师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/510/2021_2022__E5_A4_8D_E4_B9_A0_E6_8C_87_E5_c22_510158.htm

理化特性：本药每mL含醋酸氟美松龙1mg（0.1%），其分子式为C₂₄H₃₁FO₅，分子量为418.5。此外尚含有氯化苄烷胺，依地酸二钠等辅剂。药理作用：醋酸氟美松龙作为皮质激素类药物可抑制由机械、化学或免疫性因素所诱发的炎症反应，本药对外眼、内眼炎症的治疗较氟美松龙更为有效。且导致眼压升高的副作用明显低于地塞米松滴眼液。适应症：对皮质激素敏感的睑结膜、球结膜、角膜、眼前段组织炎症以及PK、PRK术后的抗炎治疗。用法用量：每次1-2滴，每日4次滴眼，在治疗初期的24-48hr内，可增至2hr一次，2周后症状若无改善，应及时复查，注意勿过早停药。注意事项：长期局部应用皮质激素通常会导致角膜霉菌感染，因此在应用皮质激素类药物时，如果发现角膜溃疡，应该考虑有霉菌感染的可能。对妊娠及哺乳的影响动物实验证明本药可致胎儿畸形，但对妊娠妇女尚未进行严格的研究工作，因此孕妇用药时应考虑本药损害胎儿的潜在危险性。局部应用皮质激素是否能够通过吸收进入乳汁尚不清楚，全身性应用皮质激素，可以在乳汁中出现，造成婴儿的不良反应，因此慎用于妊娠及哺乳妇女。『禁忌』急性单纯疱疹病毒性角膜炎，牛痘，水痘及其它由病毒、结核菌、霉菌引起的角膜及结膜炎，未经治疗的急性化脓性感染。对本药过敏者。『警告』本药不得做注射用。慎用于单纯性疱疹感染的治疗。长期应用可能导致青光眼、视神经损伤、视力下降或视野缺损、白内障及/或由于免疫抑制

而引起的继发性感染。慎用于眼部急性化脓性感染。对某些引起角膜或巩膜变薄的疾病，因长期应用皮质激素，可能导致角膜、巩膜穿孔。长期用药时应经常测量眼压。不良反应：有可能发生青光眼并伴有视神经损伤，视力下降及视野缺损，白内障，眼部继发感染，眼球穿孔。储藏：室温保存，用前摇匀。剂型规格：眼用混悬液 0.1% × 5mL"#F8F8F8"

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com