

癫痫哺乳期的用药执业医师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/510/2021\\_2022\\_\\_E7\\_99\\_AB\\_E7\\_97\\_AB\\_E5\\_93\\_BA\\_E4\\_c22\\_510357.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/510/2021_2022__E7_99_AB_E7_97_AB_E5_93_BA_E4_c22_510357.htm) 哺乳期的癫痫患者在给婴儿喂奶时要慎重考虑自己的实际情况，否则会给孩子带来一些不利的影响。正在服用抗癫痫药物的妇女，她的乳汁中必然含有一定量的抗癫痫药物，因此，婴儿吃了患病母亲的奶，就相当于自己吃了抗癫痫药物。这和母亲大量饮酒，孩子吃了母亲的奶也会醉的道理是一样的。一般人使用了毒副作用较强的抗癫痫药物后，都会出现一些不良反应。比如服用苯巴比妥常导致运动功能紊乱、共济失调，又如服丙戊酸钠会出现恶心、呕吐、胃肠不适、食欲缺乏现象，有时还会出现腹痛、腹泻等症。多药合用，毒副作用就会更大些。百考试题网站整理 婴儿对药物的排泄速度慢，比较脆弱，吃了含有抗癫痫药物的奶，会造成很大伤害。因此，妇女在哺乳期，特别是哺乳初期，最好不要服用毒副作用较强的抗癫痫药。如果怕出现较严重的发作，在用药时一定要做到慎重的选择。附带要说明一点，如果有可能出现较严重的发作，不服药也不是最好的办法。较好的办法是停止母乳喂养，并计划地将乳母和婴儿隔离。这样，既保证了婴儿不受抗癫痫药的伤害，也可保证出现发作时不给婴儿带来危险。

。"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。

详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)