

考研复习指导之考研西医外科学辅导059考研 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/551/2021_2022__E8_80_83_E7_A0_94_E5_A4_8D_E4_c73_551596.htm

骨与关节结核 一、概论 1. 病因 (1)继发于肺结核(占90%)。 (2)继发于肠结核或淋巴结核。 (3)机体抵抗能力降低，如外伤、营养不良、过度疲劳等。 2. 传播途径 血行播散(主要途径)、淋巴道转移、直接蔓延。 3. 好发部位脊柱(最常见，占50%)、膝关节、髋关节。 4. 好发人群 儿童和青少年，30岁以下占80%。 5. 病理改变 骨与关节结核的病理变化过程大致如下，见示意图。 6. 实验室检查及影像学检查 白细胞一般正常，有混合感染时增高 血沉 结核活动期、复发时血沉增快 结核杆菌培养 寒性脓肿的脓液结核杆菌培养阳性率70%，普通窦道中脓液阳性率极低，且费时X线病程2个月后，才有x线改变，故不能用于早期诊断CT可清楚显示寒性脓肿、死骨与病骨 MRI可用于早期诊断。可显示炎性阶段的异常信号和脊髓受压情况 7. 治疗 支持治疗 注意休息、加强营养、输血等 抗结核治疗 详见本讲义《内科学》第3章肺结核局部制动 小关节结核固定1个月，大关节结核固定3个月局部注射 最适用于早期单纯性滑膜结核。常用药物为异烟肼 不主张对寒性脓肿反复穿刺抽脓、注射抗结核药 切开排脓 适用于中毒症状重，寒性脓肿混合感染，病人不能耐受病灶清除术者 手术 病灶清除术 有明显死骨和大脓肿形成； 窦道长期不愈； 单纯性骨结核髓腔内压力过高者； 单纯性滑膜结核保守效果不好者； 脊髓受压者 关节融合术 适用于关节不稳定者 截骨术 用于矫正畸形 关节成形术 用于改善关节功能 二、几种结核病的鉴别 脊柱结

核髌关节结核 膝关节结核 发病率最高(占50%)第3第2部位
Lgt.Cgt.15岁如关节破坏严重，可加行膝关节骨矫形加压融合术
三、考试中易混概念 临床特点 椎间隙或关节间隙 单纯性滑膜结核 骨质疏松，关节囊肿胀 早期关节间隙增宽 单纯性骨结核 关节周围骨质疏松、骨质破坏、空洞或死骨 早期关节间隙增宽 全关节结核 关节面软骨破坏，骨质疏松、脱钙 晚期关节间隙变窄 中心型脊柱结核 好发于gt.颈椎结核>.腰椎结核。脊椎附件结核少见，一旦发病，容易发生截瘫。

1. 发病机制 可分为早期瘫痪和迟发性瘫痪两种。早期瘫痪 迟发性瘫痪 发病 病灶的活动期 病变的静止期，甚至已经愈合后 病因 脓液、坏死物质和死骨等进入椎管压迫脊髓 脊髓前动脉栓塞(可导致脊髓永久性损害) 瘢痕组织对脊髓产生环形压迫(主要原因) 骨嵴对脊髓的压迫(骨病静止型截瘫) 脊髓血管的栓塞(迟发性瘫痪)预后 原因 引起者及时手术可完全恢复 原因 可导致脊髓永久性损害 预后较早期截瘫差

2. 临床表现和诊断 脊柱结核的全身症状 局部症状 脊髓受压的表现。运动障碍—感觉障碍—大小便功能障碍。CT、MRI检查可显示病灶部位、受压情况，在MRI上还可观察脊髓有无液化所致的异常信号，可帮助估计预后。

3. 治疗 手术治疗 最新热点资讯：百考试题第一时间公布09考研调剂信息 2009各地考研成绩查询信息汇总专题 编辑特别推荐加入收藏：2009年研究生考试复试资料大汇总 考研政治基础辅导常考知识点精选汇总 09考研英语冲刺阅读理解专项训练汇总 考研冲刺：考研政治理论辅导资料汇总 更多优质信息请访问：百考试题考研站 百考试题论坛 丰富、优质考试试题请进入：百考试题在线考试中心 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详

细请访问 www.100test.com