

尖锐湿疣的诊断检查和治疗方法临床执业医师考试 PDF转换
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/593/2021_2022__E5_B0_96_E9_94_90_E6_B9_BF_E7_c22_593232.htm 一、尖锐湿疣诊断检查

根据病史和典型的临床症状即可确定诊断。必要时可行醋白试验或病理检查。女性假性湿疣 - 本病常易误诊为尖锐湿疣，诊断时宜慎重。此病为一良性乳头瘤病，不属于性传播疾病，无传染性，在20~30岁妇女的小阴唇内侧见多数1-2

mm光滑丘疹，群集但不互相融合，似鱼子状或小息肉状，有时痒，可能由于生理变异或阴道白色念珠菌致使白带增多刺激所致。

二、尖锐湿疣治疗方法 目前治疗方法甚多，常用的归纳如下：（一）足叶草脂外用：此系国外治疗本病的主要药物。但因价格贵，破坏性大，有毒性，故国外未大范围应用。

（二）高能治疗：国内常用的有冷冻疗法、CO₂激光，高频刀等，但如组织考试，大网站收集破坏不足易复发，但破坏过度又形成溃疡疤痕。操作时宜小心。

（三）手术：局麻下用利匙刮除疣组织。（四）腐蚀剂外用：30~50%三氯醋酸、五妙水仙膏等。（五）抗癌药：1、5-氟脲嘧啶制成5%霜剂或软膏。

2、2.5%的5-氟脲嘧啶注射液局部注射。

3、平阳霉素：10mg溶于1%普鲁卡因2ml中局部注射。（六）抗病毒药：5%酞丁胺霜，0.25%疱疹净软膏外用。（七）免疫

疗法：干扰素局部注射或外用。100Test 下载频道开通，各类

考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com