

妇产科学临床执业助理医师试题答案及解析临床助理执业医师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/620/2021_2022__E5_A6_87_E4_BA_A7_E7_A7_91_E5_c22_620492.htm 一、以下每一道题

下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 口服避孕药后月经第 9 天不规则出血，正确的处理方法是 A. 加服少量雌激素 B. 需立即停药 C. 加服少量孕激素 D. 加服少量雄性激素 E. 加倍服药 本题正确答案：A 题解：月经前中期出血，多因雌激素不足，可加服炔雌醇 0.005 ~ 0.015mg；若在后半期出血，可能因孕激素不足，可加服避孕片 1 / 2 ~ 1 片，至 22 天服完。

2. 最合适哺乳期妇女的避孕措施是 A. 紧急避孕药 B. 短效口服避孕药 C. 长效口服避孕药 D. 安全期避孕 E. 阴茎套避孕 本题正确答案：E 题解：阴茎套俗称避孕套，用优质乳胶制成男用避孕工具。使用方便，效果好，且能避免交叉感染，阻止精子进入阴道，达到避孕的目的。哺乳期妇女禁用避孕药。

3. 确诊为输卵管妊娠破裂、出血性休克，应采取的紧急措施是 A. 扩容 B. 输血 C. 给血管活性药物 D. 立即手术 E. 边抗休克，边开腹手术 本题正确答案：E 题解：输卵管妊娠的治疗原则是以手术为主，酌情应用保守治疗。如有休克，应在积极抢救休克的同时进行急诊手术。

4.

妊娠合并心脏病，发病率最高的是 A. 风湿性心脏病 B. 贫血性心脏病 C. 高血压性心脏病 D. 先天性心脏病 E. 围生期心脏病 本题正确答案：A 题解：妊娠并发心脏病中，以风湿性心脏病最多见，先天性心脏病次之。妊娠高血压综合征心脏病又次之。

5. 下列哪项不是孕激素的生理作用 A. 使子宫

内膜由增生期转变为分泌期 B.使宫颈黏液黏稠，拉丝度降低
C.排卵后使基础体温上升0.3~0.5 D.对下丘脑有负反馈作用
E.促进钠、水潴留 本题正确答案：E 题解：孕激素使子宫内膜由增生期转变为分泌期；子宫颈黏液变黏稠，拉丝度降低，阻止细菌与精子进入宫腔；通过对下丘脑的负反馈作用，影响垂体促性腺激素的分泌。兴奋丘脑下部体温调节中枢，升高体温。排卵后，基础体温可升高0.3~0.5；促进水、钠排出。

6. 枕左前位胎头进入骨盆入口的衔接径线是 A.双颞径 B.双顶径 C.枕下前凶径 D.枕额径 E.枕颈径 本题正确答案：D 题解：枕左前位胎头进入骨盆入口时呈半俯曲状态，以枕额径衔接，矢状缝坐落在入口平面的右斜径上，枕骨在骨盆左前方。

7. 25岁，闭经9周，腰痛，阴道流血多于月经量1天，子宫如9周妊娠大小，宫口有组织物堵塞，宫颈无举疼。最恰当的处理是 A.予以保胎治疗 B.立即行刮宫术 C.继续观察 D.进一步查尿HCG明确诊断 E.给予输液及止血剂 本题正确答案：B 题解：本例阴道流血超过正常月经量，腰痛，妇科检查子宫颈口有组织物堵塞；子宫大小与妊娠月份相符，为难免流产，应予以清宫。

8. 54岁，绝经一年，不规则阴道出血伴浆液血性白带1月余。妇科检查：阴道内无异常，宫颈光滑，子宫体略大，质软，双附件正常。此患者最可能的诊断是 A.更年期功能失调性子宫出血 B.子宫颈癌 C.子宫内膜癌 D.子宫肉瘤 E.输卵管癌 本题正确答案：C 题解：阴道流血为子宫内膜癌最主要的症状，常发生在绝经后又出现不规则阴道流血，血量一般不多，未绝经者表现为经量增多、经期延长或经间期出血。阴道排液早期多为浆液性或浆液血性白带。晚期并发感染则为脓性或脓血性分泌物，伴恶臭。

9. 不协调性子宫收缩乏力，正确的处理应为 A.静脉滴注催产素 B.第一产程中可肌注哌替啶 C.宫口开全准备助产前应再次给予哌替啶 D.人工破膜术 E.即刻剖宫手术 本题正确答案：B 题解：不协调性子宫收缩乏力的处理，主要是调节子宫收缩，使之恢复协调性。停止一切刺激，精神上给予安慰；使用镇静剂，如哌替啶100mg肌注，使产妇充分休息后可恢复协调性宫缩，恢复后如宫缩仍乏力时，可按协调性宫缩乏力处理。如不能纠正成协调性宫缩，或出现胎儿窘迫，应立即剖宫产。

10. 诊断胎儿宫内窘迫的依据不包括 A.胎心率不规则， < 100 次/分 B.胎动频繁 C.羊膜镜检羊水深绿色 D.胎儿头皮血pH值 < 7.20 E.胎位异常 本题正确答案：E 题解：急性胎儿窘迫时胎心率高于160次/分或低于120次/分，均提示胎儿窘迫。胎心率不规则，胎心率减弱，是胎儿严重缺氧的征象，最终胎心率消失，胎儿死亡。缺氧早期，表现为胎动频繁，如缺氧继续加重，引起迷走神经兴奋，肠蠕动增强，肛门括约肌松弛，胎粪排于羊水中。破膜后取胎儿头皮血测定pH值，进行血气分析，如果其pH值低于7.20提示胎儿有酸中毒，可诊断为胎儿窘迫。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com