

精神活性物质所致精神障碍有哪些表现及如何诊断临床执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E7_B2_BE_E7_A5_9E_E6_B4_BB_E6_c22_645929.htm 药物依赖的诊断标准

1.有长期或反复使用精神活性物质的历史。 2.对精神活性物质有强烈的渴求及耐受性，故至少有下列情况之二： 不能摆脱使用这种物质的欲望； 对觅取这种物质的意志明显增强

； 为使用这种物质而经常放弃其他活动或爱好； 明知这种考，试大收集整理物质有害，但仍继续使用，或为自己诡辩，或想不用或少用，但做不到或反复失败； 使用时体验到快感； 对这种物质耐受性增大； 停用后出现戒断综合征。

戒断综合征的诊断标准 1.有精神活性物质依赖史。 2.在停用或少用有依赖的精神活性物质后，至少出现下列精神症状之三： 情绪改变；如焦虑、抑郁、烦躁、易激惹等；

意识障碍； 失眠； 疲乏、倦睡； 运动性兴奋或抑制； 注意力不集中； 记忆减退； 判断力减退； 幻觉或错觉； 妄想； 人格改变。 3.伴有以下躯体症状或体征至少

二项： 恶心呕吐； 肌肉或身上各处疼痛； 瞳孔改变； 流鼻涕或淌眼泪或打哈欠； 腹痛、腹泻； 燥热感或体温升高； 严重不适； 抽搐。 4.症状的性质与严重程度随

精神活性物质的种类与剂量而定，再次足量使用，可停戒断综合征迅速消失。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com