

2010年中药鉴定中药材：刺竹笋执业药师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/646/2021\\_2022\\_2010\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_AD\\_c23\\_646001.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_646001.htm) 【出处】出自《本草纲目》。

【拼音名】Cì Zhú Sǔn 【英文名】shoot of Chinese Thorny Bamboo 【别名】竹、竹笋、竹笋 【来源】来源：考试大的美女编辑们 药材基源：为禾本科植物竹的苗。拉丁植物动物矿物名：Bambusa sinospinosa Mc Clure 采收和储藏：5-6月采收，鲜用或晒干。 【原形态】高大竹类。竿高15-24m，直径8-15cm，尾梢略弯；节间长20-26cm，常光滑无毛，惟其基部1、2节常于节下环生1圈灰白色绢毛；节处稍突起，解箨后在其箨环上暂时留有1圈稠密的暗棕色刺毛；分校常自竿基部第1、2节上即开始，竿下部的为高大竹类。竿高15-24cm，直径8-15cm，尾梢略弯；节间长20-26cm，常光滑无毛，惟其基部1、2节常于节下环生1圈灰白色绢毛；节处稍突起，解箨后在其箨环上暂留有1圈稠密的暗棕色刺毛；分枝常自竿基部第1、2节上即开始，竿下部的为单枝，向下弯拱，其上的小枝多短缩为硬刺，且相互交织而成密刺丛，竿中上部分枝为3至数枚丛生。箨鞘迟落，革质，近底缘处密生暗棕色刺毛，先端近截形；箨耳近相等，长圆形至倒卵形，有波状皱褶，腹面密被糙硬毛，边缘具毛；像舌高3-5mm，边缘齿裂并被流苏状毛；箨片直立或外展，卵形。叶鞘近无毛，边缘一侧被短纤毛；耳叶不甚发达，卵形至狭卵形，边缘具数条波曲状或劲直的毛；叶舌高约0.5mm，先端斜截形，全线，被极短的纤毛；叶片线状披针形，长7-17cm，宽12-16mm，先端渐尖，基部近圆形。假小穗线状披外形，长达4cm，单生或

数枚簇生于花枝各节；先出叶先端钝，脊上密被短纤毛；具芽胞片3-5片，狭三角形或近卵形，无毛；小穗含两性小花6-12朵；小穗轴节间长2-4mm，远离内稃的一面圆拱而被白毛，另一面则扁平而无毛，先端被短纤毛；颖常缺；外稃卵状长圆形，长5-9.5mm，先端钝急尖，多脉；内稃通常稍长于外稃，具2脊，脊上被短纤毛，脊间3-5脉；鳞被3，不相等，倒卵形，长约1.4mm，边缘密生纤毛；花丝分离，花药先端钝；子房狭窄，先端增厚而被短硬毛，花柱细长，被短硬毛，柱头3分，羽毛状。笋期5-6月，花期8-12月。【生境分布】生态环境：生于河流两岸或村落附近。来源

：[www.examda.com](http://www.examda.com) 资源分布：分布于华南、西南诸地。亦有栽培。【性味】苦；甘；凉【功能主治】清肠止痢；消积。主痢疾；消化不良【用法用量】内服：煎汤，30-60g.外用：适量，捣敷。【注意】赞宁《竹谱》：食之落人发。（引自《纲目》）【各家论述】《岭南采药录》：治竹木刺入肉：竹笋、酒精、车前子、盐，同捣敷患处。【摘录】《中华本草》更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题执业药师加入收藏 相关推荐：2010年中药鉴定中药材：刺竹叶 2010年中药鉴定中药材：刺子莞 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)