

2010年诊断基础：放射性碘治疗甲亢的相对禁忌症临床执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E8_AF_8A_c22_647973.htm 放射性碘治疗甲亢相对禁忌症，是指在下列条件下最好考虑其他治疗方法。 结节性甲状腺肿伴甲亢，扫描证实有冷结节者一般不用¹³¹I治疗。因摄碘能力的差异，治疗时用量较大，收效稍差，往往需多次反复治疗，在这种情况下应首先考虑手术切除为宜。 周围血液白细胞总数在 3×10^9 /升以下者，经升白细胞治疗改善后方可使用¹³¹I进行治疗。 本文来源:百考试题网 甲亢症状严重者，常可诱发甲状腺危象和心力衰竭，最好先用抗甲状腺药物控制症状后再行¹³¹I治疗。 更多信息请访问：百考试题 医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师加入收藏
相关推荐：2010年诊断基础：放射性碘治疗甲亢前应作的准备 2010年诊断基础：放射性碘治疗甲亢的绝对禁忌症 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com