

2011年药理学辅导：庆大霉素的药物相互作用 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E8_8D_AF_c23_647866.htm

庆大霉素的药物相互作用：可加强耳毒性。右旋糖酐可加强本类药物的肾毒性。庆大霉素与青霉素G联合，几乎对所有粪链球菌及其变种如屎链球菌种、坚韧链球菌均具协同作用。本品与竣苄西林足量联合时，对绿脓杆菌的某些敏感菌株具协同作用（但两种药物不可混合在同一输液瓶内应用，因青霉素类可使氨基糖苷类的血药浓度减低）。本品与头孢菌素类合用时肾脏毒性增加的问题，各家报道结果不一，权威学者认为目前尚无定论，但从临床经验及有关专著均倾向于二者合用可致肾毒性增加，故临床在选用前宜充分权衡利弊、慎重对待。氨基糖苷类药物相互作用：（1）与强利尿药（如呋塞米、依他尼酸等）联用可加强耳毒性。（2）与其他有耳毒性的药物（如红霉素等）联合应用，耳中毒的可能加强。（3）与头孢菌素类联合应用，可致肾毒性加强。右旋糖酐可加强本类药物的肾毒性。（4）与肌肉松弛药或具有此种作用的药物（如地西洋等）联合应用可致神经肌肉阻滞作用的加强。新斯的明或其他抗胆碱酯酶药均可拮抗神经-肌肉阻滞作用。（5）本类药物与碱性药（如碳酸氢钠、氨茶碱等）联合应用，抗菌效能可增强，但同时毒性也相应增强，必须慎重。（6）青霉素类对某些链球菌的抗菌作用可因氨基糖苷类的联用而得到加强，如目前公认草绿色链球菌性心内膜炎和肠球菌感染在应用青霉素的同时可加用链霉素（或其他氨基糖苷类）。但对其他细菌是否有增效作用并未肯定，甚至有两种药物联用而

致治疗失败报道，因此，这两类药物的联合必须遵循其适应证不要随意使用。更多信息请访问：[执业药师课程免费试听](#) [执业药师互动交流](#) [执业药师在线测试模拟题](#) [2011年执业药师药专业知识一基础习题汇总](#) 特别推荐：[2011年执业药师考试报名](#) [2011年执业药师考试大纲新变化](#) [2011年执业药师资格考试时间及科目](#) [2011年执业药师考试大纲](#) 相关推荐：[2011年药理学辅导：注射用硫酸庆大霉素的不良反应](#) [2011年药理学辅导：硫酸庆大霉素的药理作用](#) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com