

2011年医师实践技能：颈内动脉血栓形成 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/652/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_8C_BB_c22_652717.htm 可有同侧Horner征，对侧偏瘫、偏身感觉障碍、双眼对侧同向性偏盲，优势半球受累可出现失语！颈内动脉血栓形成是公卫医师实践技能考试要求掌握的内容，百考试题医师实践技能站搜集整理相关内容供大家参考。如侧枝循环代偿良好，可全无症状。若侧枝循环不良，可引起TIA，也可表现为大脑中动脉和/或大脑前动脉缺血症状。可有同侧Horner征，对侧偏瘫、偏身感觉障碍、双眼对侧同向性偏盲，优势半球受累可出现失语。眼动脉受累时，可有单眼一过性失明。颈内动脉搏动减弱或消失，听诊可闻及血管杂音。特别推荐：[#0000ff>现场报名时间汇总](#)
[#0000ff>2011年医师实践技能考试时间](#) [#0000ff>2011年医师实践技能考试大纲汇总](#) 更多信息请访问：[#0000ff>2011年实践技能考前网上辅导](#) 相关推荐：[#0000ff>2011年医师实践技能：急性苯中毒的急救处理](#) [#0000ff>2011年医师实践技能：急性苯中毒临床表现](#) [#0000ff>2011年医师实践技能：高血压病的鉴别诊断](#) 欢迎进入 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com