

2011年口腔助理：活动义齿使用注意事项 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/653/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_8F_A3_c22_653702.htm

1、活动假牙一般由塑料或不锈钢制成。咀嚼功能常比天然牙小，修复后最好先吃软的小块食物，不要吃过硬的食物。2、摘戴活动义齿应顺着一定的方向，勿用强力推拉，以免造成卡环变形或折断。3、初戴假牙时，口腔内可能有异物感，如说话不清、口水增多、甚至恶心呕吐等。如遇此种情况，不必紧张急躁，坚持戴用1~2周即可逐渐适应。4、白天应把假牙戴在口内，饭后应取出义齿用牙刷洗净。夜间睡眠假牙不戴时应泡入冷水中，以免塑料失水变形。平时注意保持口腔卫生。5、活动义齿使用数年后，因口腔组织改变或塑胶性改变不合用时，应及时修改或重作，不可勉强使用。6、初戴假牙时出现松动、压痛、过紧、咬牙过高、过低等时应及时到医院复诊，不可私自改动假牙。相关推荐：[#0000ff>2011年口腔助理医师：余留牙的保留与拔除](#) [#0000ff>2011年口腔助理医师：圆锥型套筒冠义齿](#) [#0000ff>2011年口腔助理医师：隐形义齿的几点小建议](#) 特别推荐：[#0000ff>2011年口腔助理医师考试时间](#) [#0000ff>考试大纲](#) 欢迎进入 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com